



ワクチン	種類	乳児期									幼児期					学童期／思春期								
		生直後	6週	2か月	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9-11か月	12-15か月	16-17か月	18-23か月	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10歳以上	
インフルエンザ菌b型 (ヒブ)	不活化		①	②	③						④ (注1)													
肺炎球菌 (PCV13)	不活化		①	②	③						④	(注2)												
B型肝炎	ユニバーサル		①	②					③		(注3)													
	母子感染予防	①	②						③															
ロタウイルス	1価		①	②					(注4)															
	5価		①	②	③				(注5)															
4種混合 (DPT-IPV)	不活化			①	②				③		④ (注6)		(7.5歳まで)											
3種混合 (DPT)	不活化			①	②				③		④ (注6)		(7.5歳まで)					⑤ (注7)	⑥11-12歳 (注8)					
2種混合 (DT)	不活化																			①	11歳	12歳		
ポリオ (IPV)	不活化			①	②				③		④ (注6)		(7.5歳まで)					⑤ (注9)						
BCG	生								①															
麻疹・風疹混合 (MR)	生										①									② (注10)				
水痘	生										①			②	(注11)									
おたふくかぜ	生										①									② (注12)				
日本脳炎	不活化													①	②	③	(7.5歳まで)		④9-12歳					
インフルエンザ	不活化										毎年 (10、11月などに) ①②										13歳より①			
ヒトパピローマウイルス (HPV)	不活化																			(注13)	小6	中1	中2～高1	

定期接種の推奨期間
 定期接種の接種可能な期間
 任意接種の推奨期間
 任意接種の接種可能な期間
 添付文書には記載されていないが小児科学会として推奨する期間
 健康保険での接種時期